

The Rivermead Post-Concussion Symptoms Questionnaire (RPQ) - Swedish Version

Efter en skallskada eller olycka kan en del människor uppleva symtom som kan orsaka oro eller obehag. Vi önskar veta om du lider av några av symtomen nedan. Eftersom många av dessa symtom förekommer normalt, skulle vi vilja att du jämför tiden före olyckan med tiden efter. Var vänlig och ringa in den siffra vid varje fråga som bäst stämmer överens med ditt svar.

0 = inte upplevt alls

1 = Problemet är inte större än tidigare

2 = är ett lindrigt problem

3 = är ett medelsvårt problem

4 = är ett allvarligt problem

Jämfört med före olyckan, lider du nu (det vill säga under de senaste 7 dagarna) av:

Huvudvärk	0	1	2	3	4
Känsla av yrsel	0	1	2	3	4
Illamående och/eller kräkning	0	1	2	3	4
Ljudkänslighet, blir lätt störd av högt ljud	0	1	2	3	4
Sömnstörning	0	1	2	3	4
Trötthet, blir lättare utmattad	0	1	2	3	4
Lättretlig, blir lätt arg	0	1	2	3	4
Känner dig deprimerad eller gråtmild	0	1	2	3	4
Känner dig frustrerad eller otålig	0	1	2	3	4
Glömsk, dåligt minne	0	1	2	3	4
Koncentrationssvårigheter	0	1	2	3	4
Det tar längre tid att tänka	0	1	2	3	4
Suddig syn	0	1	2	3	4
Ljuskänslig, blir lätt störd av starkt ljus	0	1	2	3	4
Dubbelseende	0	1	2	3	4
Rastlöshet	0	1	2	3	4
Upplever du några andra problem?					
1. _____	0	1	2	3	4
2. _____	0	1	2	3	4